



POLISA LEKOWA

Katalog Leków

KS/07/2019

aktualizacja na dzień 01.03.2022

Spis treści

§ 1. Informacje ogólne.....	4
§ 2. Podstawa prawna.....	4
§ 3. Karencja	4
§ 4. Katalog Leków.....	5
Leki stosowane w chorobie wrzodowej i chorobie refluksowej	5
Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby	5
Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina.....	5
Leki przeciwbiegunkowe.....	6
Leki przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne	6
Hormony stosowane ogólnie z wyłączeniem hormonów płciowych i insuliny	8
Leki stosowane w ginekologii	9
Leki stosowane w niewydolności serca	10
Leki stosowane zewnętrznie w chorobach skóry	10
Leki przeciwnadciśnieniowe	10
Leki stosowane w chorobie wieńcowej	11
Leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca	11
Leki okulistyczne	12
Leki przeciwluszczycowe.....	12
Leki stosowane w dnie moczanowej.....	13
Leki poprawiające mineralizację kości	13
Leki stosowane w chorobach oskrzeli	13
Leki stosowane w leczeniu padaczki	14
Leki przeciwalergiczne działające ogólnie	16
Leki stosowane w zaburzeniach krzepliwości i przeciwkrzepliwe	16
Leki stosowane w chorobach nowotworowych	17
Leki przeciwpasożytnicze	19
Leki przeciwzapalne	19
Leki stosowane w chorobach nosa	19
Leki stosowane w chorobie Parkinsona.....	20
Leki stosowane w mukowiscydozie	20
Leki stosowane w niedokrwistości	20
Leki stosowane w urologii.....	20
Leki zmniejszające poziom lipidów	20
Leki przeciwbólowe	21
Leki stosowane w leczeniu chorób układu nerwowego	22
Inne	22
§ 5. Jak uzyskać świadczenie pieniężne?	24

Informacja w trybie art. 17 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dziennik Ustaw pozycja 1844)

W poniższych sekcjach wskazane zostały numery postanowień Katalogu Leków, określających kwestie wskazane w nazwach tych sekcji:

l.p.	sekcja	postanowienia Katalogu Leków
1.	przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń	§1 ust. 2 §4
2.	ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia	§1 ust. 2, 3 i 4 §3 §4

§ 1. Informacje ogólne

1. Informacja o wybranym wariantcie jest podana na polisie ubezpieczeniowej.
2. Świadczenie pieniężne z tytułu ubezpieczenia przysługuje jedynie dla leków przepisanych na receptę.
3. Ubezpieczonemu przysługuje – świadczenie pieniężne do wysokości Górnej Granicy Odpowiedzialności określonej dla każdego leku wskazanego w Katalogu Leków.
4. **Górna Granica Odpowiedzialności** dla leków:
 - ❗ **refundowanych** przez płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia) jest równa różnicy pomiędzy ceną detaliczną leku, a limitem refundacji określonym w aktualnie obowiązującym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w dniu realizacji recepty.

§ 2. Podstawa prawna

1. Podstawą ochrony oferowanej przez ubezpieczenie „Polisa lekowa” w zakresie leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest zawsze aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

§ 3. Karencja

1. Karencja dotyczy jedynie leków wymienionych w Wariantcie II i nieobjętych zakresem Wariantu I. Karencja jest liczona od dnia rozpoczęcia ochrony.
2. Karencja oznacza, że świadczenie pieniężne dla leków objętych ochroną ubezpieczeniową w Wariantcie II przysługuje po 4 miesiącach od początku ochrony tzn. dla leków, na które została wystawiona recepta po 4 miesiącach od daty początku ochrony zostanie wypłacone świadczenie pieniężne.

§ 4. Katalog Leków

opis grupy leków /grupa limitowa (zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	nazwa leku (postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	wskazania (zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	Wariant I	Wariant II
Leki stosowane w chorobie wrzodowej i chorobie refluksowej				
1.0 Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	Famogast, Ranitydyna Aurovitas	wszystkie	TAK	TAK
2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	Agastin 20, Anesteloc 20, Anesteloc 40, Contix, Controloc 20, Controloc 40, Emanera, Gasec – 20 Gastrocaps, Gerdin 20, Gerdin 40, Goprazol 20, Helicid 20, Helicid Forte, Helides, Heligen Neo, Ipp 20, Ipp 40, Lanzul S, Lanzul, Mesopral, Noacid, Nolpaza 20 , Nolpaza 40, Omeprazol Aurobindo, Omeprazole Genoptim, Omeprazolium 123ratio, Ozzion, Pamył 20, Pamył 40, Panprazol, Panrazol, Pantoprazol Vitama, Pantoprazole Bluefish, Pantoprazole Genoptim, Panzol, Polprazol PPH, Polprazol, Prazol, Prenome, Progestim, Ranloc, Texibax, Ultop, Zalanzo	wszystkie	TAK	TAK
3.2, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - płynne postaci farmaceutyczne	-	wszystkie	TAK	TAK
Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby				
245.0, Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby – kwas ursodeoksycholowy	Proursan, Ursocam, Ursopol, Ursoxyn	Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby, Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą	NIE	TAK
Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina				
14.1, Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	Actrapid Penfill, Apidra SoloStar, Apidra, Fiasp, Gensulin M30 (30/70), Gensulin M40 (40/60), Gensulin M50 (50/50), Gensulin N, Gensulin R, Humalog Mix25, Humalog Mix50, Humalog, Humulin M3 (30/70), Humulin N, Humulin R, Insulin aspart Sanofi, Ins. Liprolog KwikPen, Insulatard Penfill, Insuman Basal SoloStar, Insuman Comb 25 SoloStar, Insuman Rapid SoloStar, Ins. Tresiba, Liprolog, Lispro Sanofi, Mixtard 30 Penfill, Mixtard 40 Penfill, Mixtard 50 Penfill, NovoMix 30 Penfill, NovoMix 50 Penfill, NovoRapid Penfill, Polhumin MIX - 2, Polhumin MIX - 3, Polhumin MIX - 4, Polhumin MIX - 5, Polhumin N, Polhumin R	Cukrzyca	NIE	TAK
14.3, Hormony trzustki - długodziałające analogi insuliny	Abasaglar, Lantus, Lantus Soloctar, Levemir, IIns. Ryzodeg, ns. Toujeo	Cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO); Cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat; ; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c >=8%; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii; Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia; Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej;	NIE	TAK
15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe -	Avamina, Avamina SR, Etform, Etform 500, Etform 850, Formetic, Glucophage 500,	Cukrzyca	NIE	TAK

biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym – metformina	Glucophage 850, Glucophage 1000, Glucophage XR, Metcrean, Metcrean XR, Metfogamma 1000, Metfogamma 850, Metformax 1000, Metformax 500, Metformax 850, Metformax SR 500, Metformax SR 750, Metformin Bluefish, Siofor 1000, Siofor 500, Siofor 850, Siofor XR 500, Siofor XR 750, Siofor XR 1000			
	Metformax 500, Symformin XR (Metformin XR SymPhar), Metformax SR 1000	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi		
16.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	Amaryl 1, Amaryl 2, Amaryl 3, Amaryl 4, Clazicon, Diabrezide, Diagen, Diaprel MR, Diaril, Diazidan, Glimepiride Aurovitas, Glibetic 1, Glibetic 2, Glibetic 3, Glibetic 4, Gliclada, Gliclastad, Glikuron, GlimeHexal 1, GlimeHexal 2, GlimeHexal 3, GlimeHexal 4, GlimeHexal 6, Glimepiride Genoptim, Glipizide BP, Oziclide MR, Salson, Symazide MR 30, Symazide MR 60, Symglic	Cukrzyca	NIE	TAK
17.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akarboza	Adeksa, Forxiga, Glucobay 100, Glucobay 50, Invokana, Jardiance	Cukrzyca	NIE	TAK
252.0. Leki przeciwcukrzycowe - agoniści GLP-1	Ozempic, Trulicity	Cukrzyca	NIE	TAK
Leki przeciwbiegunkowe				
10.0. Leki przeciwbiegunkowe – loperamid	Loperamid WZF	wszystkie	TAK	TAK
12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	Salaza, Salazopyrin EN, Sulfasalazin EN Krka, Sulfasalazin Krka	wszystkie	NIE	TAK
	Asamax 250, Asamax 500, Pentasa, Salazopyrin EN, Salofalk 500, Sulfasalazin EN Krka, Sulfasalazin Krka	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	NIE	TAK
12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	Asamax 250, Asamax 500, Crohnax, Pentasa, Salaza, Salofalk 1g, Salofalk 500	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	NIE	TAK
12.3. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	Pentasa, Salofalk	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	NIE	TAK
Leki przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne				
50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	Erfin, Myconafine, Terbigen, Terbinafina Aurobindo, Zelefion	wszystkie	TAK	TAK
87.0. Antybiotyki tetracyklinowe – doksycyklina	Doxycyclinum TZF, Doxycyclinum Polfarmex	wszystkie	TAK	TAK
88.1. Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	Amotaks DIS, Amotaks, Hiconcil, Amoxicillin Aurovitas, Ospamox 1000, Ospamox 500, Ospamox 750, Ospamox	wszystkie	TAK	TAK
88.2. Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	Amotaks, Hiconcil, Ospamox	wszystkie	TAK	TAK
88.4. Penicylina do stosowania doustnego - penicylina	Ospen 750	wszystkie	TAK	TAK

fenoksymetylowa - płynne postacie farmaceutyczne				
89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	Amoksiklav, Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas, Amylan, Augmentin, Augmentin SR, Co-amoxiclav Bluefish, Hiconcil combi, Penlac, Polamoklav, Ramoclav, Taromentin, Unasyn	wszystkie	TAK	TAK
89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	Amoksiklav QUICKTAB 1000, Amoksiklav QUICKTAB 625, Amoksiklav, Amoksiklav ES, Auglavin PPH, Augmentin ES, Augmentin, Hiconcil combi, Taromentin	wszystkie	TAK	TAK
89.6, Penicyliny półsyntetyczne doustne - kloksacylina	Syntarpen	wszystkie	TAK	TAK
90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	Biofuroksym, Zinacef	wszystkie	TAK	TAK
90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Bioracef, Ceclor MR, Cefox, Cefuroxime Genoptim, Ceroxim, Furocef, Xorimax 250, Xorimax 500, Zamur 250, Zamur 500, Zinnox, Zinnat	wszystkie	TAK	TAK
90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Ceclor , Ceroxim, Zinnat	wszystkie	TAK	TAK
100.1, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	Biseptol 120, Biseptol 480, Biseptol 960	wszystkie	TAK	TAK
100.2, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne	Biseptol, Bactrim	wszystkie	TAK	TAK
101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	AzituloLEK, Azycyna, Klabax EC, Klabax 125, Klabax 250, Klacid, Lekoklar, Sumamed forte, Sumamed	wszystkie	TAK	TAK
101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Apiclar, Azibiot, Azimycin, Azithromycin Genoptim, AzituloLEK 250, AzituloLEK 500, Azitrox 500, Azycyna, Fromilid 250, Fromilid 500, Klabax, Klacid, Klarmin, Lekoklar forte, Lekoklar Mite, Nobaxin, Rolicyn, Rovamycine, Sumamed, Taclar	wszystkie	TAK	TAK
102.1, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	Klimicin	wszystkie	TAK	TAK
102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie	Clindamycin-MIP 300, Clindamycin-MIP 600, Clindanea, Dalacin C, Klimicin	wszystkie	TAK	TAK
103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna	-	wszystkie	TAK	TAK
105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	Ciphin 500, Ciprinol, Cipronex, Cipropol, Proxacin 250, Proxacin 500, Tarivid 200	wszystkie	TAK	TAK
	Tarivid 200	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	TAK	TAK
106.0, Antybiotyki peptydowe - kolistyna	Colistin TZF	Mukowiscydoza	NIE	TAK
108.0, Chemioterapeutyki do stosowania doustnego - pochodne nitrofurany	Furaginum Teva, Furaginum Adamed, Furazek	wszystkie	TAK	TAK
110.1, Lek przeciwczybnicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	Flucofast, Fluconazole Aurobindo, Fluconazole Genoptim, Fluconazole Polfarmex, Flumycon (Flukonazol Actavis), Fluxazol, Itrax, Mycosyst, Orungal, Trioxal	wszystkie	TAK	TAK

110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postaci farmaceutyczne	Candifluc, Fluconazyn, Fluconazole Hasco, Fluconazole Polfarmex, Flumycon	wszystkie	TAK	TAK
111.1, Leki przeciwprądkowe - antybiotyki - ryfampicyna	Rifampicyna TZF, Rifampicyna	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	NIE	TAK
111.2, Leki przeciwprądkowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną	Rifamazid	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	NIE	TAK
112.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - pochodne triazolu - posaconazol	Posaconazole AHCL, Posaconazole Glenmark, Posaconazole Mylan, Posaconazole Sandoz, Posaconazole Stada, Posaconazole Teva	Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń	NIE	TAK
112.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego – pochodne triazolu – worykonazol	Voriconazol Polpharma, Voriconazole Accord	wszystkie	NIE	TAK
113.0, Leki przeciwprądkowe - inne - pyrazinamid	Pyrazinamid Farmapol	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	NIE	TAK
115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	Aciclovir Aurovitas, Hascovir, Heviran	wszystkie	TAK	TAK
116.0, Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postaci do stosowania doustnego	Sperart, Valcyclox, Valcyte, Valhit	Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów mięszszowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie, Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie	NIE	TAK
240.0, Leki przeciwprądkowe - inne - etambutol	Ethambutol Teva	Gruźlica, w tym również gruźlica lekooporna i inne mykobakteriozy	NIE	TAK
248.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - preparaty złożone	Salbetan	Leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych	TAK	TAK

Hormony stosowane ogólnie z wyłączeniem hormonów płciowych i insuliny

11.0, Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid	Entocort	Choroba Leśniowskiego-Crohna	NIE	TAK
11.1, Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid - we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego	Cortiment MMX	Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające	NIE	TAK
78.2, Hormony przysadki i podwzgórza - desmopressyna	Minirin Melt	Moczówka prosta przysadkowa, Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 rż z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 3-miesięcznego	NIE	TAK

		postępowania wspomagającego i motywującego		
79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	Somatuline Autogel	Akromegalia, Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych	NIE	TAK
79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	Okteva, Sandostatin, Sandostatin LAR	Akromegalia, Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami, Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnym: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Elli	NIE	TAK
80.0, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - mineralokortykoidy – fludrokortyzon	Cortineff	wszystkie	NIE	TAK
81.1, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania pozajelitowego	Diprophos	wszystkie	NIE	TAK
81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	Demezom, Pabi-Dexamethason, Dexamethasone Krka	wszystkie	NIE	TAK
82.1, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon	Meprelon, Solu-Medrol	Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego	NIE	TAK
82.2, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon - postaci o przedłużonym uwalnianiu	Depo-Medrol z Lidokainą, Depo-Medrol	wszystkie	NIE	TAK
82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	Medrol, Meprelon ,Metylpred	wszystkie	NIE	TAK
82.4, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednisolon	Encortolon, Predasol	Wszystkie	NIE	TAK
82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	Encorton	Wszystkie, nowotwory złośliwe	NIE	TAK
82.6, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - triamcynolon	Polcortolon	wszystkie	NIE	TAK
82.7, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - hydrokortyzon	Hydrocortisonum -SF	wszystkie	NIE	TAK
83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	Eferox, Euthyrox N 100, Euthyrox N 112, Euthyrox N 125, Euthyrox N 137, Euthyrox N 150, Euthyrox N 175, Euthyrox N 200, Euthyrox N 25, Euthyrox N 50, Euthyrox N 75, Euthyrox N 88, Letrox 50, Letrox 75, Letrox 100, Letrox 125, Letrox 150	Niedoczynność tarczycy	NIE	TAK
85.0, Hormony trzustki - glukagon	GlucaGen HypoKit	Cukrzyca	NIE	TAK

Leki stosowane w ginekologii

59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania douchowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwwgrzybiczym	Gyno-Femidazol	wszystkie	TAK	TAK
62.0, Leki ginekologiczne - inhibitory wydzielania prolaktyny – bromokryptyna	Bromocorn	wszystkie	TAK	TAK
Leki stosowane w niewydolności serca				
39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	Propranolol WZF, Propranolol Accord, SotaHEXAL 160, SotaHEXAL 80, Sotalol Aurovitas	wszystkie	NIE	TAK
40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	Acebutolol Aurovitas, Bicardef 10, Bicardef 5, Bisoprolol VP, Bisoratio 10, Bisoratio 5, Corectin 10, Corectin 5, Coronal 10, Coronal 5, Daneb, Ebivol, Ivineb, Metocard, Nebicard, Nebilenin, Nebilet, Nebinad, Nebispes, Nebivolol Aurovitas, Nebivolol Krka, NebivoLEK, Nebivolol Genoptim, Nebivor, Nedal, Sectral 200, Sectral 400, Sobycor	wszystkie	NIE	TAK
	Atram 12,5, Atram 25, Atram 6,25, Avedol, Carvedilol-ratiopharm, Carvetrend, Coryol, Coryol 12,5, Coryol 25, Coryol 3,125, Vivacor	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	NIE	TAK
Leki stosowane zewnętrznie w chorobach skóry				
49.0, Mikonazol w skojarzeniu z mazipredonem - do stosowania na skórę	Mycosolon	wszystkie	TAK	TAK
51.0, Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran	Iruxol Mono	wszystkie	TAK	TAK
55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania	Hydrocortisonum AFP	wszystkie	TAK	TAK
56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	Dermovate, Elitasone, Momecutan, Momecutan Fettcreme	wszystkie	TAK	TAK
Leki przeciwnadciśnieniowe				
41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Adipine, Agen10, Agen 5, Aldan, Alnet, Amlodipine Aurobindo, Amlodipine Aurovitas, Amlodipine Bluefish, Amlodipine Orion, Amlomyl, Amlopin 5, Amlopin 10, Amlozek, ApoAmlo 10, ApoAmlo 5, Cardilopin, Egiramlon, Finamlox, Lacipil, Lapixen, Lacydyna, Nitrendypina EGIS, Normodipine, Plendil, Ramizek Combi, Rimal, Sumilar, Tenox, Vilpin	wszystkie	NIE	TAK
42.0, Antagoniści wapnia - pochodne fenyloalkilaminy – werapamil	Staveran 120, Staveran 40, Staveran 80	wszystkie	NIE	TAK
43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	Dilzem 120 retard, Dilzem 180 retard, Dilzem Retard, Oxycardil 60, Oxycardil 120	wszystkie	NIE	TAK
44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Accupro 10, Accupro 20, Accupro 40, Accupro 5, Acurenal, Amlessa, Ampril 10, Ampril 5, Ampril HD, Ampril HL, Apo-Rami, Axtil, Cazaprol, Cilan, Co-Prenessa, Co-Prenessa 4 mg / 1,25 mg, Co-Prestarium, Delmuno 2,5, Delmuno 5, Dironorm, Enarenal, Indix Combi, Ivipril, LisiHEXAL 10, LisiHEXAL 20, LisiHEXAL 5, Lisinoratio 5, Lisinoratio 10, Lisinoratio 20, Lisiprol, Lisiprol HCT, Lotensin, Noliprel Bi-Forte, Noliprel Forte, Piramil 2,5, Piramil 5, Polpril, Prenessa, Prestarium 10, Prestozek Combi, Pulsaren 20, Ramicor, Ramipril Billev, Ramipril Genoptim, Ramistad 10, Ramistad 2,5, Ramistad 5, Ramipril	wszystkie	NIE	TAK

	Aurovitas, Ramve 2,5 mg, Ramve 5 18.3 mg, Ramve 10 mg, Ranopril, Tertensif Bi-Kombi, Tertensif Kombi, Tritace 10, Tritace 2,5 Comb, Tritace 2,5, Tritace 5 Comb, Tritace 5, Tritace 10, Vidotin, Vilpin Combi, Vivace 2,5, Vivace 5, Vivace 10			
45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Actelsar HCT , Actelsar, Alortia, Avasart, Avasart Plus, Axudan , Axudan HCT, Bespres, Camlocor, Candepres HCT, Candepres, Candezek Combi, Caramlo, Carzap HCT, Carzap, Co-Bespres, Co-Valsacor, Cozaar, Diovan, Dipperam, Dipperam HCT, Gisartan, Hyzaar Forte, Hyzaar, Irbesartan Aurovitas, Iprestan, Kandesar, Karbis, Karbicombi, Loreblok HCT, Loreblok, Lorista H, Lorista HD, Lorista HL, Lorista, Losacor, Losacor HCT, Losartan Bluefish, Losartan HCT Bluefish, Losartan Genoptim, Losartan + HCT Genoptim, Losartan KRKA, Losartic, Lozap 50, Lozap HCT, Micardis, MicardisPlus, Polsart Plus, Polsart, Presartan H, Presartan, Prohidna, Ranacand, Telam, Teldipin, Telmabax, Telmisartan Bluefish, Telmisartan EGIS, Telmisartan Genoptim, Telmisartan Mylan, Telmisartan Sandoz, Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS, Telmisartan Orion, Telmisartan + HCT Genoptim, Telmix, Telmix Plus, Telmizek, Telmizek HCT, Tensart HCT, Tensart, Tezeo, Tezeo HCT, Tolucombi, Tolura, Toptelmi, Toptelmi HCT, Valorion, Valsacor 80, Valsacor 160, Valsacor 320, Valsartan Medical Valley, Valtap, Valtricom, Valzek, Vanatex HCT, Vanatex, Xartan, Zanacodar, Zanacodar Combi	wszystkie	NIE	TAK
Leki stosowane w chorobie wieńcowej				
32.0, Leki pobudzające czynność serca - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego	-	wszystkie	NIE	TAK
32.1, Leki stosowane doraźnie w nagłych przypadkach anafilaksji - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego	Adrenalina WZF	Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji samoistnej	NIE	TAK
33.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - do podawania doustnego	Sustonit	wszystkie	NIE	TAK
33.2, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - produkty o natychmiastowym działaniu	Nitromint	wszystkie	NIE	TAK
34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Effox long 50, Effox long 75, Mononit 10, Mononit 100 retard, Mononit 20 , Mononit 40, Mononit 60 retard	wszystkie	NIE	TAK
Leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca				
30.0, Leki przeciwaritmiczne klasy I C - propafenon	Polfenon	wszystkie	NIE	TAK
31.0, Leki przeciwaritmiczne klasy III	Opacorden	wszystkie	NIE	TAK

- amiodaron				
31.1. Inne leki kardiologiczne – iwabradyna	Bixebra, Ivab, Ivabradine Anpharm, Ivabradine Aurovitas, Ivabradine Genoptim, Ivabradine Mylan, Ivabradine Zentiva, Ivares, Ivohart, Raenom	Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca ≥ 75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym	NIE	TAK
Leki moczopędne				
36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	Cloпамid VP, Diuresin SR, Indapamide SR Genoptim, Indapamide SR, Indapamide SR Mercapharm, Indapen SR, Indapen, Indapres, Indix SR, Ipres long 1,5, Opamid, Rawel SR, Symapamid SR, Tertens-AM, Tertensif SR, Tialorid mite, Tialorid	wszystkie	NIE	TAK
37.0. Leki moczopędne - pętlowe	Furosemidum Polfarmex, Furosemidum Polpharma	wszystkie	NIE	TAK
38.0. Antagoniści aldosteronu - spironolakton	Finospir, Spironol, Spironol 100, Verospiron	wszystkie	NIE	TAK
Leki okulistyczne				
208.0. Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu	Gentamicin WZF 0,3%	wszystkie	TAK	TAK
210.0. Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu – diklofenak	Dicloabak, Difadol 0,1%, Naclof	wszystkie	TAK	TAK
211.0. Leki przeciwjaskrowe - parasympatykomimetyki - pilokarpina	Pilocarpinum WZF 2%	Jaskra	NIE	TAK
212.2. Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	Alphagan, Azopt, Biprolast, Briglau PPH, Brinzolamide Genoptim, Combigan, Cosopt, Luxfen, Nodofree, Nodofree Combi, Nodom Combi, Nodom, Oculobrim, Oftidorix, Optilamid, Rozacom, Rozalin, Trusopt, Vizidor, Vizidor Duo	Jaskra	NIE	TAK
213.0. Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	Betoptic S, Cusimolol 0,5%, Oftensin, Optibetol 0,5%	Jaskra	NIE	TAK
214.0. Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	Akistan, Akistan Duo, Bimatoprost Genoptim, Bimican, Bimifree, Bimifree Combi, Bimaroz, Bimaroz Duo, Briglau Free, DuoTrav, Ganfort, Latacom, Latadrop, Latalux, Latanoprost Timolol Genoptim, Latanoprost Genoptim, Latanoprost STADA, Lumigan, Monoprost, Rozaduo, Rozaprost Mono, Rozaprost, Rozaprost Mono, Rozatrav, Taflotan Multi, Taptiqom, Tilaprox, Travatan, Travoprost Genoptim, Travoprost+Timolol Genoptim, Travoprost + Timolol Medical Valley, Vizibim, Vizilatan, Vizitrav, Xalacom, Xalatan, Xaloptic, Xaloptic Combi, Xaloptic Free	Jaskra	NIE	TAK
226.0. Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu	Atropinum sulfuricum WZF 1%, Tropicamidum WZF 0,5%, Tropicamidum WZF 1%	wszystkie	TAK	TAK
Leki przeciwłuszczycowe				
52.0. Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - psoraleny - metoksalen	Belosalic, Oxsoralen	wszystkie	NIE	TAK
53.0. Leki	Acitren, Enstilar, Febuxostat Krka, Neotigason	wszystkie	NIE	TAK

przeciwwłuszczykowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna				
Leki stosowane w dnie moczanowej				
145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopuryinol	Adenuric, Allupol, Argadopin, Denofix, Milurit	wszystkie	NIE	TAK
Leki poprawiające mineralizację kości				
146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	Pamifos-30, Pamifos-60, Pamifos-90	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	NIE	TAK
146.3, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas zoledronowy	Osporil, Zerlinda, Zoledronic Acid Actavis, Zomikos,	wszystkie	NIE	TAK
147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	Alendran 70, Alendrogen, Alendronat Bluefish, Alendronic Acid Genoptim, Osteo max 70 comfort, Ostenil 70, Ostolek, Risendros 35	Osteoporoza	NIE	TAK
231.0, Leki stosowane w chorobach kości - przeciwciała monoklonalne - denosumab	Prolia	Osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, ze złamaniem osteoporotycznym, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania	NIE	TAK
Leki stosowane w chorobach oskrzeli				
197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	Aspulmo, Berotec N 100, Buventol Easyhaler, Sabumalin, Ventolin	wszystkie	NIE	TAK
197.2, Doustne leki beta-2-mimetyczne o krótkim działaniu, przeznaczone do stosowania w leczeniu chorób układu oddechowego	Salbutamol Hasco	wszystkie	NIE	TAK
198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	Atimos, Foradil, Foramed, Forastmin, Formoterol Easyhaler, Oxis Turbuhaler, Oxodil PPH, Pulmoterol, Pulveril, Serevent Dysk, Serevent, Zafiron	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc	NIE	TAK
199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	Asaris, Duexon Pro, Salmex, Seretide 50, Seretide Dysk 100, Symbicort Turbuhaler	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach	Airbufo Forspiro, AirFluSal Forspiro, Asaris, Bufomix Easyhaler, Comboterol, Duexon, Duexon Pro, DuoResp Spiromax, Fluticomb, Fostex, Salfumix Easyhaler, Salmex, Seretide 125, Seretide Dysk 250, Symbicort, Symbicort Turbuhaler, Symflusal	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	AirFluSal Forspiro, Asaris, Bufomix Easyhaler, Comboterol, Duexon Pro, DuoResp Spiromax, Fostex, Salmex, Seretide 250, Seretide Dysk 500, Symbicort Turbuhaler, Symflusal, Trimbrow	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	Alvesco 160, Alvesco 80, Asmanex Twisthaler, Budesonide Easyhaler, Budezonid LEK-AM, Budiair, Flixotide Dysk, Flixotide, Flutixon, Flurhinal, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler, Ribuspir	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty	BDS N, Benodil, Budixon Neb, Nebbud	Wszystkie, Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc,	NIE	TAK

jednoskładnikowe - postaci płynne do nebulizacji w niskich dawkach		eozyfilowe zapalenie oskrzeli		
200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postaci płynne do nebulizacji w średnich dawkach	BDS N, Benodil, Budixon Neb, Nebbud	wszystkie, Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozyfilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postaci płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	BDS N, Benodil, Budixon Neb, Nebbud, Pulmicort	Wszystkie, Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozyfilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	Atrodil, Atrovent N, Atrovent, Berodual N, Berodual	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozyfilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	Braltus, Spiriva, Srivasso	Wszystkie, Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową	NIE	TAK
	Incruse, Seebri Breezhaler, Spiriva Respimat,	Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia	NIE	TAK
201.3, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o długim działaniu	Anoro, Spiolto Respimat, Ultibro Breezhaler	Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia	NIE	TAK
203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postaci o przedłużonym uwalnianiu	Euphyllin Long, Theospirex retard	wszystkie	NIE	TAK
204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	Asmenol, Astmodil, Milukante, Monkasta, Montelukast Bluefish, Montelukast Medreg, Montelukast Sandoz, Orilukast, Promonta 10, Promonta 4, Promonta 5, Romilast	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozyfilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
Leki stosowane w leczeniu padaczki				
155.2, Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - fenobarbital - postaci do podawania doustnego	Luminalum, Luminalum UNIA	Padaczka	NIE	TAK
156.0, Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - fenytoina	Phenytoinum WZF	Padaczka	NIE	TAK
157.0, Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - etosuksymid	Petinimid	Padaczka	NIE	TAK
158.1, Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego – benzodiazepiny	Clonazepamum TZF	Padaczka	NIE	TAK
159.1, Lek przeciwpadaczkowy do	Finlepsin 400 retard, Neurotop retard 600, Tegretol CR 400	Padaczka	NIE	TAK

stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	Amizepin, Finlepsin 200 retard, Finlepsin, Neurotop retard 300, Tegretol CR 200	wszystkie	NIE	TAK
159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	Tegretol	wszystkie	NIE	TAK
160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne	Karbagen, Oxcarbazezin NeuroPharma, Oxepilax	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
160.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - płynne postacie farmaceutyczne	Trileptal	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	Convulex, Convulex 150, Convulex 300, Depakine	Padaczka	NIE	TAK
161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	Absenor, Convival Chrono, Depakine Chrono 300, Depakine Chrono 500, Depakine Chronosphere 100, Depakine Chronosphere 1000, Depakine Chronosphere 250, Depakine Chronosphere 500, Depakine Chronosphere 750, ValproLEK 300, ValproLEK 500	Padaczka	NIE	TAK
162.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigabatryna - płynne postacie farmaceutyczne	Sabril	Padaczka oporna na leczenie; Zespół Westa	NIE	TAK
162.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigabatryna - stałe postacie farmaceutyczne	Sabril	Padaczka oporna na leczenie; Zespół Westa	NIE	TAK
162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	Gabitril	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	Epitrigine 50, Epitrigine 100, Lamilept, Lamitrin, Lamotrix, Symla	Padaczka oporna na leczenie, padaczka	NIE	TAK
163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	Lamitrin S	Padaczka oporna na leczenie, padaczka	NIE	TAK
164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatu	Epitoram, Etopro, Oritop, Topamax, Topiramatu Bluefish, Toramat	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	Gabapentin Aurovitas, Gabapentin Teva, Neurontin 100, Neurontin 300, Neurontin 400, Neurontin 600, Neurontin 800	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	Cezarius, Keppra, Levebon, Levetiracetam Accord, Levetiracetam Aurovitas, Levetiracetam NeuroPharma, Normeg, Polkepral, Trund, Vetira	Padaczka oporna na leczenie, padaczka	NIE	TAK
166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego -	Cezarius, Levetiracetam NeuroPharma, Trund, Vetira	Padaczka oporna na leczenie, padaczka	NIE	TAK

lewetiracetam - płynie postacie farmaceutyczne				
244.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – lakozamid	Briviact, Lacosamide Accord, Lacosamide Glenmark, Lacosamide Teva, Trelema, Seizpat, Vimpat, Zilibra	Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej	NIE	TAK
244.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - styrypentol	Diacomit	Terapia wspomagająca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem	NIE	TAK
Leki przeciwalergiczne działające ogólnie				
207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Alermed, Allertec, Amertil, Cetirizine Genoptim, Cezera, Contrahist, Dasselta, Delortan, Deslodyna, Desloratadine Aurovitas, Dynid, Flonidan, Hitaxa, Jovesto, Lecetax, Letizen, Lirra, Loratadyna Galena, Loratan, Nossin, Rupaller, Zenaro, Zyrtec, Zyx	wszystkie	NIE	TAK
207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Allertec, Contrahist, Deslodyna, Dynid, Flonidan, Hitaxa, Jovesto, Loratan, Zyrtec, Xyzal	wszystkie	NIE	TAK
Leki stosowane w zaburzeniach krzepliwości i przeciwkrzepliwe				
21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K	Acenocumarol WZF, Warfin	wszystkie	NIE	TAK
22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	Clexane forte, Clexane, Fraxiparine, Fraxodi, Neoparin, Neoparin Forte	wszystkie	NIE	TAK
	Eliquis, Pradaxa, Xarelto 10	Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	NIE	TAK
	Pradaxa, Xarelto 15, Xarelto 20	Leczenie zakrzepicy żył głębokich oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia	NIE	TAK
23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - kłopidogrel	Areplex, Clopidix, Clopidogrel Bluefish, Clopidogrel KRKA, Grepid, Pegorel, Plavocorin, Vixam, Zyllt	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	NIE	TAK
23.2, Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	Aclotin	wszystkie	NIE	TAK
24.1, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania pozajelitowego	-	wszystkie	NIE	TAK
24.2, Leki antyfibrynolityczne - kwas	-	wszystkie	NIE	TAK

traneksamowy do stosowania doustnego - postacie stałe				
24.3, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie płynne	-	wszystkie	NIE	TAK
25.0, Witamina K i inne leki hemostatyczne - fytomenadion	Vitacon	wszystkie	NIE	TAK
Leki przeciwmigrenowe				
154.0, Leki przeciwmigrenowe - ergotamina	Ergotaminum Filofarm	wszystkie	TAK	TAK
Leki stosowane w chorobach nowotworowych				
117.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki alkilujące - cyklofosfamid	Endoxan	Wszystkie, Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	Methotrexat-Ebewe	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
	Methofill, Methotrexat-Ebewe, Trexan Neo	wszystkie		
120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	Ebetrexat, Metex, Methofill, Methofill SD, Namaxir	wszystkie	NIE	TAK
126.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne - hydroksymocznik	Hydroxyurea Medac, Hydroxycarbamid Teva	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
127.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - medroksyprogesteron do podawania pozajelitowego	Depo-Provera	Nowotwory złośliwe- Rak piersi i rak trzonu macicy	NIE	TAK
128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne	Cachexan, Megace, Megalia, Megastril	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	Diphereline SR 11,25, Diphereline SR 3,75, Eligard 7,5, Eligard 22,5, Eligard 45, Leuprostin, Librexa, Reseligo, Tranexamic acid Accord, Zoladex LA, Xanderla, Xanderla LA	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	NIE	TAK
	Reseligo, Zoladex, Xanderla,	Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy	NIE	TAK
130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny – tamoksifen	Tamoxifen Sandoz, Tamoxifen-EGIS, Tamoxifen-Ebewe 20	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej	Apo-Flutam, Flutamid EGIS	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	Anastrozol Bluefish, Apo-Nastrol, Arimidex, Aromek, Atrozol, Clazole, Egistrozol, Etadron, Etruzil, Glandex, Lametta, Letrozole Bluefish, Symex, Symletrol	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii. Wczesny rak piersi w I rzucie	NIE	TAK

133.0, Lek przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	Accofil, Zarzio,	wszystkie	NIE	TAK
134.0, Lek przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	CellCept, Marelim, Mycofit (Mycophenolate Mofetil Accord), Mycophenolate mofetil Sandoz 500, Mycophenolate mofetil Sandoz 250, Myfenax,	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	NIE	TAK
135.1, Lek przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus	Rapamune	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	NIE	TAK
135.2, Lek przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne – ewerolimus	Certican	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	NIE	TAK
136.0, Lek przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	Arava, Leflunomid Bluefish, Leflunomide medac, Leflunomide Sandoz, Leflunomide Zentiva	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	NIE	TAK
137.1, Lek przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Cyclaid, Equoral, Sandimmun Neoral	wszystkie	NIE	TAK
138.2, Lek przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Equoral, Sandimmun Neoral	wszystkie	NIE	TAK
139.0, Lek przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	Advagraf, Dailiport, Envarsus, Prograf	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	NIE	TAK
140.0, Lek przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	Azathioprine VIS, Imuran	Wszystkie, Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
206.1, Lek przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego	Torecan	Wszystkie, Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
206.2, Lek przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego	Torecan	Wszystkie, Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
230.0, Lek przeciwnowotworowe antymetabolyty - merkaptopuryna	Mercaptopurinum VIS	Nowotwory złośliwe, Choroba Lesniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	NIE	TAK

233.0, Lek przeciwnowotworowe - leki alkilujące - chlorambucyl	Leukeran	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
234.0, Lek przeciwnowotworowe - antymetabolity - analogi puryn - tioguanina	Lanvis	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
235.0, Lek przeciwnowotworowe - leki alkilujące - melfalan	Alkeran	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
236.0, Lek przeciwnowotworowe - leki alkilujące - busulfan	Myleran	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
237.0, Lek przeciwnowotworowe - antagoniści hormonów i leki zbliżone - degareliks	Firmagon	Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu krokowego	NIE	TAK
7.1, Lek przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postaci do podawania doustnego	Atossa, Ondansetron Bluefish, Setronon, Zofran Zydis, Zofran	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
7.2, Lek przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postaci do podawania doodbytniczego	Zofran	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
8.0, Lek przeciwwymiotne - inne – aprepitant	Aprepitant Accord, Aprepitant Mylan, Aprepitant Sandoz, Aprepitant Stada, Aprepitant Teva, Emend	Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m ² – profilaktyka	NIE	TAK
Leki przeciwpasożytnicze				
192.0, Lek przeciwmalaryczne - chlorochina	Arechin	wszystkie	TAK	TAK
194.1, Lek przeciwwrobacze - mebendazol	Vermox	wszystkie	TAK	TAK
Leki przeciwzapalne				
141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postaci farmaceutyczne	Aglan 15, Anapran EC, Anapran, Apo-Napro, Aulin, Aspicam, Bi-Profenid, Diclo duo, Febrofen, Ibuprofen Hasco, Ibuprofen Polfarmex, Ketokaps Med, Ketonal DUO, Ketonal forte, Ketoprofen-SF, Majamil prolongatum, Mel Forte, Meloxistad, Movalis, Nabuton VP, Nalgessin Forte, Napritum, Naproxen 250 Hasco, Naproxen 500, Naproxen Genoptim, Naproxen Polfarmex, Olfen 75 SR, Olfen Uno, Opokan forte, Profenid, Refastin, Remolexam, Trosicam	wszystkie	NIE	TAK
141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	Naproxen Hasco, Profenid	wszystkie	NIE	TAK
141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	Diclac, Ketoprofen-SF Naklofen, Olfen 75	wszystkie	NIE	TAK
141.4, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	Aulin, Nimesil	wszystkie	NIE	TAK
Leki stosowane w chorobach nosa				
196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	Fanipos, Flixonase Nasule, Flixonase, Metmin, Momester, Nasometin, Pronasal	wszystkie	NIE	TAK

Leki stosowane w chorobie Parkinsona				
167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden	Akineton, Akineton SR 4 mg	Choroba i zespół Parkinsona	NIE	TAK
168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	Madopar HBS, Madopar, Madopar 125, Madopar 250, Madopar 62,5, Nakom Mite, Nakom, Sinemet CR 200/50	Choroba i zespół Parkinsona	NIE	TAK
169.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - amantadyna	Viregyt-K	Choroba i zespół Parkinsona	NIE	TAK
170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	Aparxon PR, ApoRopin, Aropilo, Aropilo SR, Ceurolex SR, Nironovo SR, Oprymeia, Polpix SR, Pronoran, Repirol SR, Requip, Requip Modutab, Rolpryna SR, Ropodrin	Choroba i zespół Parkinsona	NIE	TAK
171.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina	Segan, Selgres	Choroba i zespół Parkinsona	NIE	TAK
Leki stosowane w mukowiscydozie				
13.0, Enzymy trzustkowe	Kreon 25000, Lipancrea 16000	Mukowiscydoza, Stan po resekcji trzustki	NIE	TAK
205.2, Leki mukolityczne - domaza alfa	Pulmozyme	Mukowiscydoza	NIE	TAK
Leki stosowane w niedokrwistości				
26.0, Witamina B12 - cyjanokobalamina	Vitaminum B12 WZF	wszystkie	TAK	TAK
Leki stosowane w urologii				
74.0, Leki urologiczne zmieniające pH moczu - cytryniany do sprężdzania roztworu doustnego	Citrolyt	wszystkie	TAK	TAK
75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina	Ditropan, Driptane, Oxybutynin hydrochloride Accord	Stwardnienie rozsiane	NIE	TAK
75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	Adablok, Afenix, Beloflow, Defur, Silamil, Solifenacin Stada, Solifurin, Solinco, Soreca, Titlodine, Tolterodine Accord, Tolzurin, Uronorm, Urimper, Uroflow SR, Uroflow 1, Uroflow 2, Vesisol, Vesoligo, Zevesin	Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	NIE	TAK
76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	Adadox, Apo-Doxan 1, Apo-Doxan 2, Apo-Doxan 4, Cardura XL, Doxalong, Doxanorm, Doxazosin Genoptim, Doxar, Doxazosin XR Genoptim (DoxaLEK), Doxonex, Doxorion, Dozox, Hytrin, Kamiren XL, Kamiren, Kornam, Zoxon 1, Zoxon 2, Zoxon 4	wszystkie	NIE	TAK
	Adadox, Adatam, Adatam XR, Alfabax, Alfurion, Alfuzostad 10, Apo-Doxan 1, Apo-Doxan 2, Apo-Doxan 4, Apo-Tamis, Bazetham Retard, Cadura XL, Dalfaz SR 5, Dalfaz Uno, Doxalong, Doxanorm, Doxar, Doxazosin Aurovitas, Doxazosin Genoptim, Doxonex, Doxorion, Dozox, Fokusin, Hytrin, Kamiren XL, Kamiren, Kornam, Omnic 0,4, Omnic Ocas 0,4, Omsal 0,4, Prostamnic, Ranlosin, Silodosin Aurovitas, Silodosin Recordati, Symlosin SR, Tamiron, TamisPras, Tamoptim, Tamoptim (TamsuLEK), Tamsudil, Tamsugen 0,4, Tanyz, Tanyz ERAS, Uprox, Uprox XR, Urostad, Zoxon 1, Zoxon 2, Zoxon 4	Przerost gruczołu krokowego	NIE	TAK
77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	Adaster, Adadut, Androster, Antiprost, Apo-Fina, Dutafin, Finamef, Finaran, Finaster, Finarestid Stada 5, Finasteridum Bluefish, Finpros 5, Finxta, Hyplafin, Penester, Proscar, Symasteride, Uronezyr, Zasterid	Przerost gruczołu krokowego	NIE	TAK
Leki zmniejszające poziom lipidów				

46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Apo-Atorva, Apo-Simva 10, Apo-Simva 20, Apo-Simva 40, Atoris, Atorvagen, Atorvastatin Bluefish AB, Atorvastatin Genoptim, Atorvastatin Vitama, Atorvastatin123ratio, Atorvasterol, Atractin, Atorvox, Atrox 10, Atrox 20, Atrox 40, Atrox, Crosvuo, Esetin, Lambrinex, Larus, Liprox, Lovasterol, Ridlip, Romazic, Rosuvastatin Aurovitas, Rosutrox, Roswera, Simcovas, Simorion, Simratio10, Simratio 20, Simratio 40, Simvacard 10, Simvacard 20, Simvacard 40, Simvachol, Simvagen 20, Simvagen 40, SimvaHEXAL 10, SimvaHEXAL 20, SimvaHEXAL 40, Simvastatin Bluefish, Simvastatin Genoptim, Simvastatin Aurovitas (Aurobindo), Simvasterol, Storvas CRT, Suardio, Torvacard 10, Torvacard 20, Torvacard 40, Torvacard, Torvalipin, Tulip, Tulip 40, Tulip 80, Vasilip, Vastan, Ximve, Zahron, Zaranta, Zocor 10, Zocor 20, Zocor 40	wszystkie	NIE	TAK
47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	Apo-Feno 200 M, Biofibrat, Fenardin, Grofibrat 200, Grofibrat, Grofibrat M. Grofibrat S, Lipanor, Lipanthy 200M, Lipanthy 267M, Lipanthy Supra 160, Lipanthy Supra 215	wszystkie	NIE	TAK
48.0, Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	Coroswera, Etibax, Ezehron, Ezehron Duo, Ezen, Ezoleta, Ezolip (Ezetimibe Glenmark), Ezetimibe Genoptim, Lipegis, Rozesta, Suardio Plus	Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z p	NIE	TAK
Leki przeciwbólowe				
149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postaci o przedłużonym uwalnianiu	MST Continus, Vendal retard	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia; nowotwory złośliwe	NIE	TAK
149.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	Morphini sulfas WZF	Wszystkie, nowotwór złośliwy	NIE	TAK
149.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postaci o niemodyfikowanym uwalnianiu	Sevredol	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia; Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	Accordeon, OxyContin, Oxydolor, Oxylaxon, Reltebon	Wszystkie, Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	NIE	TAK
150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	DHC Continus	Wszystkie, Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
150.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - metadon	Methadone Hydrochloride Molteni	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
150.4, Opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon w połączeniach	Oxynador, Oxyduo, Rizmoic, Targin	Ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia popioidowe	NIE	TAK
152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego	Effentora, Vellofent	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	NIE	TAK

152.2, Opioidowe leki przeciwbólne - postacie do stosowania donosowego	Instanyl, PecFent	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	NIE	TAK
152.3, Opioidowe leki przeciwbólne - postacie do stosowania podjęzykowego	Bunondol	Wszystkie, Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
152.4, Opioidowe leki przeciwbólne - postacie do stosowania przezskórnego	Durogesic, Fentanyl Actavis 100 µg/h, Fentanyl Actavis 25 µg/h, Fentanyl Actavis 50 µg/h, Fentanyl Actavis 75 µg/h, Matrifen 12, Matrifen 25, Matrifen 50, Matrifen 75, Matrifen 100	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalia	NIE	TAK
	Melodyn, Transtec 35 mcg/h, Transtec 52,5 mcg/h, Transtec 70 mcg/h, Fenta MX 25, Fenta MX 50, Fenta MX 75, Fenta MX 100	Wszystkie, Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
153.1, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postacie do podawania doodbytniczego	Tramal	Wszystkie, Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
153.2, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	Tramal	Wszystkie, Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Doreta, Exbol, Padolten, Palgotal, Poltram, Poltram Combo, Poltram Combo Forte, Poltram Retard 100, Poltram Retard 150, Poltram Retard 200, Tramadol + Paracetamol Genoptim, Tramadol Aurovitas, Tramadol Krka, Tramadol SYNTEZA, Tramal Retard 50, Tramal Retard 100, Tramal Retard 150, Tramal Retard 200, Tramal, Tramapar	Wszystkie, Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
153.4, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Poltram, Tramadol Krka, Tramadol SYNTEZA, Tramal	Wszystkie, Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
153.5, Opioidowe leki przeciwbólne - tapentadol	Palexia retard	Przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych - u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana	NIE	TAK

Leki stosowane w leczeniu chorób układu nerwowego

144.0, Leki działające rozkurczowo na mięśnie szkieletowe - tizanidyna	Sirdalud MR, Tizanor	Stwardnienie rozsiane	NIE	TAK
188.0, Leki parasympatykomimetyczne - bromek pirydostygminy	Mestion	Wszystkie, Miastenia	NIE	TAK
189.0, Leki parasympatykomimetyczne - ambemonium	-	wszystkie	NIE	TAK
191.0, Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego-bocznego - riluzol	Riluzol PMCS	Stwardnienie zanikowe boczne	NIE	TAK
242.0, Leki działające na układ nerwowy - pregabalina	Lyrica, Naxalgan, Preato, Pregabalin Sandoz	Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym	NIE	TAK

Inne

148.0, Leki znieczulające miejscowo - lidokaina w połączeniu z norepinefryną - roztwór do wstrzykiwań	-	wszystkie	TAK	TAK
239.0, Leki chelatujące miedź - penicylamina	Cuprenil	Choroba Wilsona	NIE	TAK
241.0, Leki stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym - konestat alfa	Ruconest	Przerwanie ostrego, zagrażającego życiu ataku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego, obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną	NIE	TAK
241.1, Leki stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym – ludzki inhibitor C1-esterazy	Beriner 500, Beriner 1500	Przerwanie ostrego, zagrażającego życiu ataku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego, obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną, Przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród),	NIE	TAK
241.2, Leki stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym - ikatybant	Firazyr	Leczenie ostrych zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy	NIE	TAK

§ 5. Jak uzyskać świadczenie pieniężne?

1. Zwrot części poniesionego kosztu leku przysługuje jedynie w stosunku do leków przepisanych przez lekarza na receptie i wymienionych w Katalogu Leków dla wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia.
2. Ubezpieczony powinien, po poniesieniu kosztów leków przepisanych przez lekarza na receptie, wysłać:
 - a. kopię recepty;
 - b. oryginał faktury, rachunku lub paragonu;
 - c. wypełniony wniosek o zwrot kosztów;


do - TU Zdrowie SA. Wniosek o zwrot kosztów jest zawsze dostępny na stronie www.polisalekowa.pl. Przyznany zwrot kosztów zostanie przesłany na rachunek bankowy Ubezpieczonego podany we wniosku o zwrot kosztów

3. Kopię recepty można również przesłać oddzielnie, jako fotografię, plik MMS na numer telefonu 723-444-999 lub adres e-mail recepta@polisalekowa.pl
4. Jeżeli Ubezpieczony poniósł koszty leków przepisanych przez lekarza w Aptece Partnerskiej - TU Zdrowie SA, aby otrzymać –świadczenie pieniężne w systemie online, musi podpisać i zaakceptować „Druk otrzymania -świadczenia pieniężnego” dostępny w Aptece Partnerskiej.
5. W celu uzyskania – świadczenia pieniężnego w trybie on–line konieczne jest przedstawienie imiennej Karty Ubezpieczenia wystawionej na Ubezpieczonego, będącego jednocześnie pacjentem, którego dane są zgodne z danymi umieszczonymi na receptce.

Niniejszy Katalog Leków o kodzie KS/07/2019 został przyjęty na mocy uchwały Zarządu UZ/43/2019 dnia 20.11.2019 r i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tym dniu.

Zmiany §4 wynikające ze zmiany Obwieszenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie wymagają podjęcia nowej uchwały.

Prezes Zarządu
Aleksander Roda



Członek Zarządu
Sławomir Koszewski





Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE Spółka Akcyjna

Kapitał zakładowy w wysokości 21 950 000 zł. opłacony w całości,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000362027, NIP 5862257567, REGON 221064894

Siedziba: ul. Śląska 17, 81-319 Gdynia, tel. 58 888 2 999
Biura Handlowe: ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa, tel. 58 888 2 999
ul. Bocheńskiego 38A lok. 225, 40-859 Katowice, tel. 58 888 2 999